



**UNIVERSIDADE
TIRADENTES**

PROCESSO SELETIVO DE TRANSFERÊNCIA EXTERNA

→ MEDICINA

2023.1 – 6º SEMESTRE

DADOS DO CANDIDATO

NOME:

INSCRIÇÃO:

CADEIRA:



Strix
educação

PROCESSO SELETIVO DE TRANSFERÊNCIA EXTERNA – 2023.1

CURSOS DE MEDICINA – SEGUNDA ETAPA


➡ Este Caderno de Prova contém uma Prova Teórica – com 25 questões objetivas de múltipla escolha com quatro alternativas cada, identificadas por A, B, C, D.

➡ Antes de iniciar a Prova, confira a sequência das páginas e da numeração das questões do seu Caderno de Prova. Se identificar qualquer equívoco, informe imediatamente ao aplicador de prova.

➡ Para responder corretamente à Prova leia atentamente as orientações de cada questão.

➡ Utilize caneta de tinta **azul** ou **preta**, fabricada em material transparente. Não é permitido usar lápis e/ou borracha.

➡ As respostas das questões objetivas deverão ser registradas na Folha de Respostas própria, preenchendo integralmente o círculo correspondente à alternativa escolhida, conforme o **exemplo**:



Só existe uma alternativa correta para cada questão.

➡ Assine no espaço próprio da Folha de Respostas. Folha de Respostas identificada fora desse espaço implicará na anulação da Prova e consequente eliminação do candidato do Processo Seletivo. Questão com resposta rasurada ou respondida a lápis ou com mais de uma alternativa marcada não será considerada.

➡ O tempo total para realização dessa Prova é de duas horas.

➡ Não será permitido que o candidato leve o Caderno de Provas, sendo fornecido formulário próprio para que registre as suas respostas e possa realizar a conferência dos seus acertos quando da publicação do Gabarito.

➡ Ao concluir sua Prova, sinalize para o aplicador de prova e aguarde para entregar a Folha de Respostas, cumprindo os procedimentos por ele recomendados.

➔ Prova Teórica – Questões de 1 a 25

➔ Questões Objetivas

Instruções ➔

Para responder as questões, identifique APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque a letra correspondente na Folha de Respostas



QUESTÃO / 1

Paciente vítima de politrauma com fratura exposta de cotovelo. No momento do atendimento pré-hospitalar, encontra-se agitado mas não se queixa de dor.

Isso ocorre devido à ação de:

- A) Glutamato.
- B) Aspartato.
- C) Encefalinas.
- D) Cortisol.

QUESTÃO / 2

A dor lombar com irradiação para membros inferiores é uma condição comum e incapacitante.

Pode-se afirmar que a Pseudociatalgia se caracteriza por dor associada

- A) à presença de osteófitos na coluna.
- B) ao tônus aumentado no músculo piriforme.
- C) à compressão abaixo da pelve do nervo ciático.
- D) à neoplasia metastática em coluna.

QUESTÃO / 3

Na dor crônica, têm sido utilizados estímulos físicos para controle. Pode-se afirmar que a principal ação do estímulo elétrico transcutâneo nessa condição é:

- A) Bloqueio medular por estímulo de fibras Aβ de diâmetro largo.
- B) Despolarização neuronal dos nociceptores.
- C) Bloqueio medular por estímulo de fibras do tipo C estreitas.
- D) Bloqueio central no sistema límbico das fibras aferentes.

QUESTÃO / 4

A Síndrome do intestino irritável é uma condição frequente que pode afetar crianças e adultos, levando à dor abdominal recorrente.

Quanto a esta Síndrome, pode-se afirmar que há:

- A) Facilitação dos estímulos aferentes conduzidos por fibras mielinizadas.
- B) Atividade inflamatória intensa desencadeada por alimentos.
- C) Maior percepção de estímulos fisiológicos, interpretados como nódicos.
- D) Envolvimento transmural das vísceras ocas com estímulo peritoneal.

QUESTÃO / 5

Homem, 45 anos de idade, tabagista, hipertenso, apresenta dor torácica súbita.

A principal característica que torna improvável a dor cardíaca é:

- A) Caráter urente (em queimação).
- B) Irradiação para o lado direito.
- C) Irradiação para o pescoço.
- D) Caráter ventilatório dependente.

QUESTÃO / 6

A giardíase é uma condição parasitária comum e amplamente disseminada no mundo.

A diarreia causada pela *Giardia lamblia* se caracteriza por:

- A) Tenesmo.
- B) Presença de muco.
- C) Presença de sangue.
- D) Fezes volumosas e flatulência.

QUESTÃO / 7

A condição decorrente da modernidade que mais tem aumentado de importância como causa de inflamação hepática capaz de causar cirrose e câncer de fígado, é:

- A) Síndrome metabólica.
- B) Uso de drogas endovenosas.
- C) Uso de álcool.
- D) Hepatite C.

QUESTÃO / 8

Homem, 24 anos de idade, com crises de vômitos cíclicos, incoercíveis, não associados à alimentação, com duração de 2 dias e remissão espontânea. Nega cefaleia. Notou que melhora quando toma banhos quentes.

Deve-se pesquisar nesse paciente, como causa da dor:

- A) Hipertensão arterial lábil.
- B) Uso de Cannabis.
- C) Uso de álcool.
- D) Hiperglicemia.

QUESTÃO / 9

Mulher, 64 anos de idade, vem há um mês com urina de cor castanha. Houve também mudança da cor das fezes. Há uma semana passou a apresentar prurido. Familiares notaram olhos amarelos e relatam perda de peso.

O mecanismo causal mais provável para esses sintomas é:

- A) Distúrbio da conjugação da bilirrubina.
- B) Distúrbio da excreção de bile do hepatócito.
- C) Obstrução biliar dos canais intrahepáticos.
- D) Obstrução biliar extra hepática.

QUESTÃO / 10

Algumas medicações são capazes de aumentar a bilirrubina indireta no sangue, sem causar hemólise e sem elevação das enzimas hepáticas.

A principal suspeita, nesses casos, é:

- A) Competição com ácido glicurônico.
- B) Inflamação dos canaliculos biliares.
- C) Inflamação da papila duodenal.
- D) Redução dos sais biliares na vesícula.

QUESTÃO / 11

Embora na maioria das vezes o abdome agudo exija tratamento cirúrgico imediato, há condições em que a cirurgia é dispensada ou postergada por semanas.

Uma dessas condições é:

- A) Rotura de aneurisma de aorta.
- B) Pancreatite aguda.
- C) Megacólon tóxico.
- D) Isquemia mesentérica aguda.

QUESTÃO / 12

Mulher, 32 anos de idade, sem comorbidades, vem há 24hs apresentando diarreia com 6 dejeções por dia e com febre, precedida por vômitos.

Quanto ao tratamento dessa paciente, pode-se afirmar:

- A) A presença de leucócitos nas fezes indica a necessidade de antibióticos.
- B) O uso de medicações antidiarreicas, como a loperamida, é necessário.
- C) A presença de febre indica origem bacteriana, favorecendo antibioticoterapia.
- D) O consumo de fibras alimentares pode melhorar a diarreia.

QUESTÃO / 13

A dor é uma manifestação clínica presente em muitas doenças. A dor crônica se caracteriza como um problema em si, com necessidade de tratamento específico.

Considere os itens abaixo

- I. Analgésicos não opioides.
- II. Opioides fracos (codeína, tramadol).
- III. Antiinflamatórios não hormonais.
- IV. Opioides fortes (morfina, dolantina).

Indique a sequência progressiva de tratamento da dor, segundo a OMS

- A) I, II, III e IV.
- B) I, II e IV.
- C) I, III e IV.
- D) I, II, IV e III.

QUESTÃO / 14

Paciente com neoplasia de mama multi-metastática, fora de possibilidade de tratamento curativo, em tratamento paliativo, está internada para controle da dor. Vem estável, com redução da medicação venosa no controle da dor, passando para medicação oral.

Considerando o melhor cuidado dessa paciente, pode-se afirmar que:

- A) Ela pode ser acompanhada na Atenção Primária, uma vez que está estável.
- B) A condição de tratamento paliativo implica em tratamento em unidade terciária de saúde.
- C) Uma vez que a dor foi a causa do tratamento, a alta fica condicionada à sua resolução.
- D) Sendo uma paciente terminal, deve continuar tratamento em hospital de crônicos.

QUESTÃO / 15

O tratamento com dor crônica é complexo e exige um plano terapêutico singular para cada paciente.

Com relação a esse plano pode-se dizer que:

- A) o uso de terapias complementares, como acupuntura e musicoterapia, não tem base científica estabelecida.
- B) A dor crônica tem sempre um componente psíquico que merece atenção psicológica especial, justificando a presença de profissionais da área.
- C) As terapias complementares devem ser reservadas para os casos de palição onde outras medidas não deram certo.
- D) As terapias complementares são mais eficientes e seguras, que o uso de fármacos, no controle da dor crônica.

QUESTÃO /16

A diarreia persiste sendo uma importante causa de mortalidade infantil no mundo inteiro.

Quanto à prevenção da mortalidade por diarreia, no mundo, pode-se dizer que:

- A) A reidratação oral com soro caseiro foi capaz de reduzir a mortalidade, mas não a incidência de diarreia.
- B) As condições de higiene e saneamento são suficientes para impedir que crianças menores de 5 anos tenham diarreia.
- C) O aleitamento materno tem impacto na incidência de diarreia mas não na letalidade da diarreia aguda infantil.
- D) Os hábitos individuais e familiares de higiene e alimentação têm mais importância no controle da diarreia do que os aspectos sociais.

QUESTÃO /17

Sendo importante causa de mortalidade infantil, a notificação das diarreias é essencial para seu controle.

Com relação a esta notificação, pode-se dizer que:

- A) É obrigatória para casos com duração maior que três dias, independente da causa.
- B) Casos com disenteria são os que devem ser notificados compulsoriamente.
- C) Diarreias de curta duração, sem complicações, como as rotavíruses, dispensam notificação.
- D) Na definição de casos para notificação, são necessárias mais de três dejeções por dia.

QUESTÃO /18

O uso da escala visual analógica de dor tem aspectos propedêuticos importantes.

Sobre esta escala, pode-se dizer que:

- A) Não é sensível para detecção de dor crônica de leve intensidade.
- B) Usa aspectos da limitação funcional e do trabalho por causa da dor.
- C) É de difícil compreensão por indivíduos sem escolaridade.
- D) É a melhor escala para comparações entre indivíduos.

QUESTÃO /19

O Sinal de Blumberg (dor à descompressão súbita do abdome) é importante na pesquisa do abdome agudo.

Sobre este sinal, pode-se afirmar que

- A) é condição indispensável para definição de irritação peritoneal.
- B) depende de fibras nervosas mielinizadas para a constatação.
- C) indica envolvimento de vísceras ocultas no abdome agudo.
- D) pode ser pesquisado em todo o abdome.

QUESTÃO /20

A resistência de microorganismos aos antibióticos vem sendo considerada um problema grave em todo o mundo. Considerando os antibióticos, as penicilinas são as que mais vêm sofrendo resistência, e de forma cruzada, dentro da classe de droga. Isso se deve, biologicamente, à:

- A) Ação exclusiva nos gram positivos.
- B) Ação nos ribossomos.
- C) Presença de anel betalactâmico.
- D) Rápida metabolização e excreção.

QUESTÃO /21

As aminas simpático-miméticas são drogas que, quando utilizadas, são capazes de:

- A) Inibir o sistema nervoso parassimpático.
- B) Simular a ação da epinefrina e da norepinefrina.
- C) Provocar a ação das cininas vasoativas.
- D) Causar broncoconstrição.

QUESTÃO /22

A combinação de medicamentos é uma das complicações mais temíveis que afetam a segurança dos pacientes.

Considera-se que há incompatibilidade medicamentosa, quando há:

- A) Interação química ou física entre as moléculas dos fármacos.
- B) Modificação do sistema de absorção da droga.
- C) Competição por sítios proteicos de ligação e transporte.
- D) Modificação da metabolização e excreção.

QUESTÃO /23

Homem, 56 anos de idade, diabético e hipertenso, apresenta perda da força muscular no Membro inferior direito. Ao exame neurológico, verifica-se reflexo cutâneo plantar com extensão do Hálux.

Esse sinal denota lesão

- A) no córtex motor.
- B) na via piramidal.
- C) nos tratos motores da medula.
- D) nos axônios dos nervos motores.


QUESTÃO / 24

O diapasão, como ferramenta de propedêutica neurológica, serve para outros fins além de verificar a integridade auditiva. Uma das principais condições clínicas nas quais essa ferramenta pode indicar alterações é na deficiência de:

- A) Piridoxina.
- B) Riboflavina.
- C) Cianocobalamina.
- D) Ácido ascórbico.

QUESTÃO / 25

Um jogador de futebol sofreu um trauma de joelho direito. Ao avaliar o joelho, o médico do time verificou que, colocado o paciente em decubito dorsal com o fêmur imobilizado e leve flexão da perna, ao tracionar a tibia para frente, havia maior instabilidade com protusão anterior que no joelho esquerdo.



Esse sinal indica que houve :

- A) Fratura da patela.
- B) Derrame sinovial.
- C) Lesão do ligamento cruzado anterior.
- D) Lesão do menisco.



www.strixeducacao.com.br

Todos os direitos reservados. Proibida a publicação ou reprodução, ainda que parcial, sem a permissão expressa da Strix Educação.



Este Caderno de Provas foi impresso em papel de florestas plantadas e 100% renováveis

